



Garmil®

FUNGICIDA MULTICULTIVO

Fungicida de amplio espectro y gran eficacia preventiva sobre numerosas enfermedades en diversos cultivos. Posee una limitada acción erradicante y efecto cicatrizante sobre heridas de poda y pedrisco.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Albaricoquero, melocotonero y nectarino: Chancro y monilia.

Frutales de pepita: Monilia y moteado.

Ajos, apio, cebolla, cebollino y chalote: Mildiu, botritis y septoria.

Brécol, coles de Bruselas, coliflor y repollo: Alternaria y mildiu.

Cucurbitáceas de piel no comestible, pepinillo y pepino: Antracnosis y mildiu.

Fresales y grosellero: Antracnosis, botritis, mildiu, mancha púrpura y septoria.

Garbanzo: Rabia.

Guisantes para grano y judías para grano: Alternaria y botritis.

Patata: Alternaria y mildiu.

Solanáceas: Alternaria, antracnosis, botritis, mildiu y septoria.

Perejil, perifollo, puerro y zanahoria: Alternaria, mildiu, botritis y septoria.

Arándano, arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas: Antracnosis, botritis y septoria.

Cebada, trigo y triticale: Helminthosporium y septoriosis.

Composición	Clortalonil 50% p/v (500 g/l)
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
R.O.P.M.F. n°	21.825
Envasado	5 Litros
Clasificación	Nocivo (Xn), Peligroso para el Medio Ambiente (N)

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal a dosis de 250 - 300 cc/hl, mojando bien todas las partes de la planta.

PLAZO DE SEGURIDAD

Solanáceas, cucurbitáceas de piel no comestible, pepinillo, pepino, perejil y perifollo: 3 días.

Albaricoquero, frutales de pepita, melocotonero, nectarino, cebada, trigo, triticale, guisantes, judías para grano, patata y zanahoria: 15 días.

Resto de cultivos: 10 días.