



## HERBICIDA PARA TRIGO Y CEBADA

Herbicida para el control de malas hierbas en el cultivo de cereales de invierno. Aplicado en preemergencia, controla eficazmente la mayoría de malas hierbas de hoja ancha, así como varias gramíneas. Aplicado en postemergencia, controla la mayoría de hierbas de hoja ancha pero es menos eficaz contra las gramíneas.

### APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos herbicidas en preemergencia o postemergencia precoz del **trigo** y en postemergencia precoz de la **cebada**, contra malas hierbas anuales de hoja ancha en pre o postemergencia de éstas. Es eficaz contra Vallico y Phalaris cuando se aplica en preemergencia de éstos.

<b>Composición</b>	Clorsulfuron 75% p/p (750 gr/Kg)
<b>Formulación</b>	Granulado Dispersable en Agua (WG)
<b>R.O.P.M.F. n°</b>	22.725
<b>Envasado</b>	100 g
<b>Clasificación</b>	Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A    Aves: A    Peces: A

### MOMENTO DE APLICACIÓN

#### Trigo

En preemergencia: es preferible aplicar inmediatamente después de la siembra o, en todo caso, dentro de las dos semanas siguientes a la misma.

En postemergencia precoz: tratar cuando el cultivo tenga 2-3 hojas hasta principio del encañado.

#### Cebada

En postemergencia precoz: tratar cuando el cultivo tenga 3 hojas hasta principio del encañado.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización a baja presión, para el control de malas hierbas dicotiledóneas anuales, *Phalaris* spp. y *Vallico* spp. en pre o postemergencia

de las mismas. Cebada: Contra dicotiledóneas anuales aplicar en postemergencia precoz del cultivo y en pre- o postemergencia de las malas hierbas. Contra Phalaris y Vallico, aplicar en postemergencia precoz del cultivo y en preemergencia de las malas hierbas.

Trigo: Contra dicotiledóneas anuales, aplicar en pre o postemergencia precoz del cultivo, y en pre- o postemergencia de las malas hierbas. Contra Phalaris y Vallico, aplicar en pre o postemergencia precoz del cultivo y preemergencia de las malas hierbas.

DOSIS: Contra dicotiledóneas anuales: 14 gr/ha. Contra Phalaris y Vallico: 20 gr/ha.

### CONDICIONES DE APLICACION PREPARACION DEL CALDO

Echar agua en el depósito hasta 1/4 de su capacidad. Añadir luego el producto con el agitador en marcha, si se deben añadir otros productos herbicidas hacerlo siempre a continuación. Acabar de llenar el depósito con el resto del agua, continuando la agitación.

### APLICACION

Para una buena eficacia, el suelo debe estar bien preparado y libre de terrones.

Pulverizar uniformemente a baja presión (inferior a 5 atmósferas), usando un equipo bien calibrado, con agitación continua. Usar la suficiente cantidad de agua para asegurar un reparto uniforme; por ejemplo, 200-400 l/ha, con los equipos normales de aplicación terrestre. Evitar pulverizar cultivos colindantes y sobredosificaciones por dobles pasadas, solapes o paradas accidentales, que podrían causar daños al cultivo o a los siguientes en la rotación.

No tratar en días de viento, con el fin de evitar que la pulverización alcance cultivos vecinos o parcelas contiguas que vayan a sembrarse con otros cultivos. Puede aplicarse con temperatura ambiente baja.

El producto actúa en presencia de humedad. Una lluvia ligera dentro de las 2-3 semanas siguientes a la aplicación aseguran la mejor eficacia del producto; condiciones de sequía reducen la velocidad de la acción herbicida.

No dar labores después del tratamiento, para no reducir la eficacia del producto.